Scala BBCH per la vite

Stadio principale di crescita 0: Sviluppo delle gemme

00 Dormienza: le gemme invernali si presentano appuntite o arrotondate, chiare o marrone scuro in base alla cultivar. Le scaglie che ricoprono le gemme sono più o meno chiuse a seconda della cultivar

01 Inizio dell'ingrossamento delle gemme: le gemme iniziano a rigonfiarsi all'interno delle perule che le racchiudono

03 Fine dell'ingrossamento delle gemme: le gemme sono rigonfie ma non ancora verdi

05 "Gemme cotonose". Una peluria cotonosa è chiaramente visibile

07 Inizio dell'apertura delle gemme: le punte verdi dei germogli sono appena visibili

08 Rottura delle gemme: le punte verdi dei germogli sono chiaramente visibili

Stadio principale di crescita 1: Sviluppo delle foglie

11 La prima foglia si distende e si allontana dal germoglio

12 Seconda foglia distesa

13 Terza foglia distesa

15 Quinta foglia distesa e germogli lunghi 10 cm

1 … Lo stadio continua fino a …

19 Nove o più foglie distese

Stadio principale di crescita 5: Emergenza delle infiorescenze

53 Le infiorescenze sono chiaramente visibili

55 Le infiorescenze sono rigonfie; i fiori sono ancora chiusi e raggruppati tra loro

57 Le infiorescenze sono pienamente sviluppate e i fiori tra di loro separati

Stadio principale di crescita 6: Fioritura

60 La prima caliptra si distacca dal ricettacolo

61 Inizio della fioritura: il 10% delle caliptre è caduto

62 Il 20% delle caliptre è caduto

63 Il 30% delle caliptre è caduto

64 Il 40% delle caliptre è caduto

65 Piena fioritura: il 50% delle caliptre è caduto

66 Il 60% delle caliptre è caduto

67 Il 70% delle caliptre è caduto

68 L'80% delle caliptre è caduto

69 Fine della fioritura

Stadio principale di crescita 7: Sviluppo dei frutti

71 I giovani frutti iniziano ad ingrossarsi; c'è ancora presenza di residui fiorali (allegagione)

73 Acini delle dimensioni di un granello di pepe (mignolatura)

75 Acini delle dimensioni di un pisello (sviluppo del grappolo)

77 Gli acini cominciano a toccarsi (chiusura grappolo)

79 La maggior parte degli acini si tocca

Stadio principale di crescita 8: Maturazione dei frutti

81 Inizio della maturazione: le bacche iniziano a manifestare il colore tipico della cultivar

83 Le bacche continuano a cambiare il colore

85 "Addolcimento" degli acini

89 I grappoli sono maturi per la raccolta

Stadio principale di crescita 9: Senescenza, inizio della dormienza

91 Dopo la raccolta; fine della maturazione del legno
91 Le foglie iniziano a ingiallire
93 Inizio della caduta delle foglie
95 Il 50% delle foglie è caduto
97 Le foglie sono tutte cadute
99 Prodotto raccolto

La registrazione dei dati FENOLOGICI per la vite

1 - Registrazione vincolata

Fasi fenologiche – codice BBCH		**Fasi fenologiche – codice BBCH**	
Gemme d'inverno - 00	☐	Fioritura - 65	☐
Gemma rigonfia/cotonosa - 05	☐	Allegagione - 71	☐
Apertura gemme/Germogliamento - 08	☐	Mignolatura - 73	☐
Foglie distese - 11	☐	Pre-chiusura grappolo - 75	☐
Grappoli visibili - 53	☐	Chiusura grappolo - 77	☐
Grappoli separati - 55	☐	Invaiatura - 81	☐
Bottoni fiorali separati - 57	☐	Maturazione - 89	☐
Inizio fioritura - 61	☐	Caduta foglie - 93	☐

2 – Registrazione libera

Fasi fenologiche	**BBCH**	**Fasi fenologiche**	**BBCH**
Sviluppo delle gemme (00 – 8)	…….	Sviluppo dei frutti (71 - 79)	……..
Sviluppo delle foglie (11 - 19)	……..	Maturazione (81 - 89)	……..
Emergenza delle infiorescenze (53 - 57)	…….	Senescenza/Dormienza (91 - 99)	……..
Fioritura (60 - 69)	…….		